L'OMS recommande le dépistage de H. pylori pour la prévention du cancer gastrique





R0192C Durée de conservation de 24 mo

· Hautes sensibilité et spécificité

- · Aussi précis qu'un test respiratoire à l'urée sans préparation fastidieuse du patient
- · La performance n'est pas impactée par les IPP ou les antibiotiques



H. pylori Ab Combo Test rapide

R0191C Durée de conservation de 24 mois à partir de la date de fabrication

- · Très utile pour les études de population à grande échelle
- · La performance n'est pas impactée par les saignements gastriques
- · Options échantillon de sérum, plasma et sang total





H. pylori Ab + Ag Tests Rapides 🤇 🤇





FACTEURS DE RISQUE

Risque de propagation lors de la consommation de nourriture ou d'eau contaminées par de la matière fécale



SYMPTÔMES

- La plupart des personnes atteintes de gastrite ou de duodénite chroniques ne présentent aucun symptôme
- Sans diagnostic ni traitement, des problèmes graves peuvent survenir, notamment des ulcères de l'estomac ou du duodénum
- Certains cas de gastrite chronique peuvent conduire à certaines formes de cancer



QUI DOIT SE FAIRE TESTER

Si vous avez des symptômes

le test diagnostique de l'infection à H. pylori est recommandé si vous avez un ulcère gastrique ou duodénal actif ou des antécédents d'ulcère

- Si vous n'avez pas de symptômes

 - · les personnes ayant des antécédents familiaux de cancer gastrique · les personnes qui vivent avec ou à proximité immédiate d'une personne infectée par h. pylori
 - · les personnes qui vivent dans des zones endémiques possibles



MÉTHODES DE TEST

Test name	Type	Description	Délai de résultat
Test des anticorps	Non-invasif	 Non affecté par les saignements gastriques Facile à réaliser 	15 minutes
Test antigénique	Non-invasif	 Hautes spécificité et sensibilité Non affecté par les IPP ou les antibiotiques Facile à réaliser 	15 minutes
Test respiratoire à l'urée	Non-invasif	 Hautes spécificité et sensibilité Longue préparation du patient, ~1 mois Nécessite l'ingestion d'un liquide radioactif 	10 minutes
Test d'uréase rapide	Invasif	 Haute spécificité mais faible sensibilité Sensibilité réduite chez les patients qui présentent des saignements gastriques Certains médicaments doivent être évités 	90 minutes
Culture	Invasif	 Haute spécificité mais faible sensibilité Coûteux, nécessite de faire appel à un médecin Certains médicaments doivent être évités 	3 jours



H. pylori Ag Kit de contrôle externe pour test rapide (€

- Permet de respecter la qualité de laboratoire
- Améliore et normalise le processus de CQ



Scanner pour en savoir plus sur le Lecteur de test rapide de CTK ou rendez-vous sur CTKBIOTECH.COM



